

Grasas y ácidos grasos.

Insecto	grasa cruda	Ácidos grasos saturados	Simple insaturado saturados	Múltiples insaturado saturados	Omega-3 saturados	Omega-6 saturados	Ácido linoléico
Cantidad por 100 g	g	g	g	g	g	g	g
Pinkies Topinsect	11,3	4,33	4,77	2,19	0,20	0,02	1,98
Gusanos bufalo Topinsect	7,7	1,90	3,35	2,45	0,25	0,03	2,33
Larvas del gusano de la harina Topinsect	14,8	3,29	6,37	4,05	0,16	0,03	3,86
Larvas de polilla de la cera Topinsect	23,7	7,94	12,29	1,58	0,11	0,03	1,45
Grillo doméstico adulto Topinsect	6,6	2,11	1,58	2,32	0,06	0,04	2,22
Escarabajo del gusano de la harina	5,1	1,12	1,75	1,35	0,04	0,02	1,29
Larvas del gusano rey	18,3	6,94	6,91	3,56	0,11	0,04	3,40
Otros alimentos a modo de comparación							
Leche entera	3,5	2,2	1,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Bacalao	0,6	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0
Carne de ternera magra	6,5	2,2	2,9	1,00	nc	nc	nc
Aceite de maíz	100	13	30	56	1	nc	55
Pollo	9	2,4	4,2	1,90	0,30	1,70	1,60
Análisis realizados sobre el peso total crudo / nc = no se conoce © copyright - ® Topinsect							