

Grassi e acidi grassi.

Insetto	Grasso grezzo	Acidi grassi saturi	Semplici acidi grassi insaturi	Complessi acidi grassi insaturi	Omega-3 Acidi grassi	Omega-6 Acidi grassi	Acido linoleico
Quantità per 100 g	g	g	g	g	g	g	g
Pinkies di Topinsect	11,3	4,33	4,77	2,19	0,20	0,02	1,98
Buffalo worms di Topinsect	7,7	1,90	3,35	2,45	0,25	0,03	2,33
Tarme della farina larva Topinsect	14,8	3,29	6,37	4,05	0,16	0,03	3,86
Larve del miele Topinsect	23,7	7,94	12,29	1,58	0,11	0,03	1,45
Grillo adulto Topinsect	6,6	2,11	1,58	2,32	0,06	0,04	2,22
Tarme della farina - coleottero	5,1	1,12	1,75	1,35	0,04	0,02	1,29
Tarme della morio – larva	18,3	6,94	6,91	3,56	0,11	0,04	3,40
Altri alimenti a confronto							
Latte intero	3,5	2,2	1,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Merluzzo	0,6	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0
Carne magra di vitello	6,5	2,2	2,9	1,00	n.c.	n.c.	n.c
Olio di mais	100	13	30	56	1	n.c	55
Pollo	9	2,4	4,2	1,90	0,30	1,70	1,60
Analisi effettuate sul peso totale del prodotto a crudo / n.c. =non conosciuto - ©copyright ®Topinsect							